

Til de danske Minkfodercentraler

16. april 2014

KOPENHAGEN FUR
LANGAGERVEJ 60
2600 GLOSTRUP

TLF 4326 1000
FAX 4326 1126
KOPENHAGENFUR.COM
CVR-NR. 15275413

NORDEA BANK DANMARK A/S
KONTONR. 2100-0751141270
SWIFT NDEADKXX

KOPENHAGEN FORSKNING
AGRO FOOD PARK 15
8200 ÅRHUS N

TLF 7213 2800
FAX 7213 2801
FORSKNING@
KOPENHAGENFUR.COM

FODRINGSANBEFALINGER

FODRING DIEGIVNING OG TIDLIG VÆKST

Som nævnt i sidste skrivelse, er det vigtigt, at de første kuld, der fødes, bliver kontrolleret indenfor første levedøgn. Ved denne kontrol skal der være fokus på, om der er mange små kuld, mange dødfødte hvalpe eller mange hvalpe, der ikke er gjort ordentligt rene i nakken. Ser man dette, tyder det på besværlige fødsler, som kan skyldes overfodring af de drægtige tæver, og fodermængden til de tæver, der ikke har født endnu, skal derfor sættes ned. Ligeledes skal tævens ædelyst i forbindelse med fødslen vurderes. Tæven skal helst have spist af foderklatten den dag, hun føder. Bemærkes problemer, eller er ædelysten for ringe, anbefales en væsentlig reduktion af foderet et par dage. Er udfodringen allerede sket, udskydes næste dags fodringstidspunkt.

En hurtig og problemfri fødsel er den optimale start på diegivningsperioden, da den er forudsætningen for, at tæven hurtigt tager sig af de nyfødte hvalpe.

De første dage efter fødsel er mælkeproduktionen meget begrænset, og det er tævens behov for foder derfor også. Tæven kan sagtens producere mælk nok i de første dage efter fødsel, uden at hun sættes op i foder. Efterhånden som hvalpene bliver større, øges mælkeproduktionen, og den bliver mere og mere energirig. Det tilsammen øger tævens behov for foder. Det skal dog stadig være sådan, at tæven først skal have mere foder, når tråden er slikket helt ren, hvilket indikerer, at hun aktivt efterspørger mere foder (Bemærk: Der er forskel på helt ren tråd alt afhængig af, hvilken maskestørrelse fodertråden har. Jo mindre maskestørrelse, desto sværere har tæven ved at gøre tråden helt ren).

Der er mange forskellige principper for fodring i diegivningsperioden. Nogle anvender individuel fodring i yderste konsekvens, andre anvender individuel fodring med en fast stigning (enten i procent eller i gram), og atter andre fodrer blot nogle flere gange om dagen. Uanset hvilket fodringsprincip man har valgt at anvende, er succesraten afhængig af, hvor dygtig fodermesteren er til at vurdere, hvornår der skal justeres i fodertildelingen.

Når hvalpene bliver omkring 3½ uge gamle, begynder tæven så småt at tage foder med ind i redekassen, således at hvalpene kan slikke noget fast foder i sig. Når hvalpene er 4½ uge gamle begynder de for alvor at tage fast foder til sig. Når først hvalpene er kommet godt i gang med at æde minkfoder, skal de fodres efter ædelyst. Det er i denne periode, at de har det største vækspotentiale, og har man ikke tilfredsstillende vækst i hvalpene i juni og begyndelsen af juli, får man ikke store skind ved pelsning.

En vigtig faktor i de første uger, hvor hvalpene æder minkfoder, er deres væskeforsyning. Der går næsten 2 uger fra hvalpene begynder at spise minkfoder, til de begynder at drikke vand af drikkepiplen. For at sikre at hvalpene får mest mulig væske gennem foderet, er det mest hensigtsmæssigt at fodre flere gange om dagen. Foderet skal derfor tilsættes mest muligt vand i denne periode. Også her skal man være opmærksom på, at der er forskel på, hvor meget vand foderet kan bære alt afhængig af, om man har 1x1 tomme tråd eller 1x3/4 tomme tråd. Ved de kuld, hvor der er problemer med væskeforsyningen, kan der anvendes kaninvandere for at hjælpe hvalpene.

På vegne af København Rådgivning,
Vilhelm Weiss